

## แนวทางการปรึกษาและส่งต่อโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชน

เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้พบผู้ป่วยหรือ อสม.)

1. F : ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว ตามัว (ตาตก มุมปากตก)
  2. A : แขนขาอ่อนแรง ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หรือ ลุกจากท่านอนมานั่งด้วยตนเองไม่ได้ (ไม่สามารถทำได้เท่าเดิมที่เคยทำได้มาก่อนหน้านี้)
  3. S : พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดไม่เป็นคำ พูดซ้ำ (การพูดเพื่อการสื่อสารแปลกไปจากปกติ)
  4. T : ระยะเวลาการเกิดอาการให้นับจากการพบอาการที่เป็นปกติครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาใด
- \*\*\* เวลามาตรฐานในการให้ยาละลายลิ่มเลือด คือ 4 ชั่วโมง 30 นาที
- \*\*\* ในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาในการเตรียมการรักษา 1 ชั่วโมง ดังนั้นต้องให้ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

โรงพยาบาลที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 1. พหลพลพยุหเสนา | ศูนย์ส่งต่อ 034-587800 ต่อ6767 |
| 2. มะการักษ์     | ห้องฉุกเฉิน 034-543169         |
| 3. ทองผาภูมิ     | ห้องฉุกเฉิน 034-599361         |

โทร 1669

ผู้พบเห็น

รับนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ให้กลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วย/อาสาสมัครประจำครอบครัวหรือผู้พบเห็น ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น

โทรปรึกษาและแจ้งข้อมูลผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

โทรแจ้ง 1669 โดยด่วน หรือ

เบอร์โทร.....อสม./อสม. หมอประจำบ้าน

เบอร์โทร.....เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน

เบอร์โทร.....ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเขตของท่าน

## แนวทางการปรึกษาและส่งต่อโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้พบผู้ป่วยหรือ อสม.)

๑. F : ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว ตามัว (ตาดก มุมปากตก)
  ๒. A : แขนขาอ่อนแรง ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หรือ ลุกจากท่านอนมานั่งด้วยตนเองไม่ได้(ไม่สามารถทำได้เท่าเดิมที่เคยทำได้มาก่อนหน้านี้)
  ๓. S : พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดไม่เป็นคำ พูดซ้ำ (การพูดเพื่อการสื่อสารแปลกไปจากปกติ)
  ๔. T : ระยะเวลาการเกิดอาการให้นับจากการพบอาการที่เป็นปกติครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาใด
- \*\*\* เวลามาตรฐานในการให้ยาละลายลิ่มเลือด คือ ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที
- \*\*\* ในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาในการเตรียมการรักษา ๑ ชั่วโมง ดังนั้นต้องให้ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง

ผู้พบเห็นรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

๑. เมื่อมาถึงห้องฉุกเฉิน พยาบาลคัดกรองซักประวัติพบมีอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองต้องปฏิบัติดังนี้
  - ติดต่อแพทย์ประเมินอาการ /ติดต่อทำเอ็กซเรย์สมอง/วัดสัญญาณชีพ /ประเมินอาการของโรค เจาะเลือด
๒. เมื่อได้ผลเอ็กซเรย์/ผลเจาะเลือด พยาบาลห้องฉุกเฉินรายงานแพทย์ห้องฉุกเฉิน
๓. แพทย์ห้องฉุกเฉินปรึกษาแพทย์อายุรกรรมในเวลาห้องตรวจโรค ๔ (นอกเวลาแพทย์เวรอายุรกรรม) ประเมินอาการและความพร้อมเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด
๔. แพทย์อธิบายความจำเป็น ข้อดีข้อเสียในการให้ยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วย/ญาติเซ็นยินยอมให้ยา
๕. แพทย์เวรห้องฉุกเฉินและอายุรแพทย์ร่วมประเมินความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยา
๖. พยาบาลห้องฉุกเฉินให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ห้องฉุกเฉินและเตรียมประสานเคลื่อนย้ายมายัง Stroke Unit
๗. พยาบาลห้องฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยยัง Stroke Unit

### \*\*\*กรณีให้ยาที่ รพ.ทองผาภูมิ\*\*\*

๑. เมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลซักประวัติ ประเมินอาการ ส่งเอกซเรย์ เตรียมLAB เรียบร้อยแล้วพบว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด ประสานส่งต่อ รพ.พหลฯ
  - ในเวลาราชการ/นอกเวลาที่มีแพทย์เวรอายุรกรรม ให้แพทย์ปรึกษาแพทย์อายุรกรรมทองผาภูมิ
  - นอกเวลาราชการ/ไม่มีแพทย์อายุรกรรมอยู่เวร ให้แพทย์ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม รพ.พหลฯ
๒. เมื่อให้ยาที่ห้องฉุกเฉินหมด ประเมินอาการคงที่ ประสานอาการหลังให้ยาและส่งต่อมา รพ.พหลฯ